

ニトルアー™ 〈アメシロ〉

(フォールウェブル剤)



基本データ

有効成分：(3Z,6Z,9S,10R)-シス-9,10-エポキシ-3,6-ヘニコサジエン 0.58mg/枚
(3Z,6Z,9S,10R)-シス-9,10-エポキシ-1,3,6-ヘニコサトリエン 0.49mg/枚
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-オクタデカトリエン-1-アール 4.3mg/枚

性状：片面黒色、片面白色の張り合わせシート

その他成分：ポリエステルフィルム、ポリエステル樹脂等

有効期間：常温で約3か月

容器及び内容：内装 製剤1枚ごとをポリエチレンビニルアルコール製フィルムに密封
外装 内装2枚を、クラフト化工紙に入れる

特長

- 性フェロモンの強力な誘引力を利用し、専用トラップ（捕獲器）でオス成虫を大量に捕獲します。
- 次世代のアメリカシロヒトリ幼虫（毛虫）の発生を抑制します。
- 捕獲数から被害状況や防除適期を予測（発生予測）できます。
- 自然への影響が少なく環境を保全、作業者にも安全です。
- 人体・有用昆虫・魚介類・植物等にはほとんど影響がありません。
- 人通りの多い歩道の街路樹や公園・住宅地での使用に最適です。

適用害虫の範囲及び使用方法

作物名	使用目的	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法
樹木類	誘引	アメリカシロヒトリ	直線使用（街路樹など） 40m当り1個以上	成虫発生初期 から発生後期	本剤をトラップ1台 当り1個貼付け、地 上1～6mの高さに設 置する
			面使用（公園など） 10a当り3個以上		

専用トラップ (別売り)



モストラップ

使用上の注意事項

- 本剤はアメリカシロヒトリの雄成虫を誘引して、本剤と併用するトラップにより成虫を捕獲し、次世代のアメリカシロヒトリ幼虫の被害を低減させることを目的としています。
- 本剤はフェロモンを利用したもので、アメリカシロヒトリ雄成虫の誘引を目的としており、直接致死させることを目的としたものではありません。このため本剤使用中に幼虫が大量発生した場合には、薬剤散布・剪定などの有効な防除手段を併用して講じて下さい。
- アメリカシロヒトリの発生期間はおよそ4月から9月の約6か月間であるので、発生時期に応じて製剤を使用して下さい。最大の効果を得るためにはアメリカシロヒトリの第1回成虫（越冬世代）の発生前から施用を開始し、発生終了までの全世代に対して誘引捕獲を行って下さい。但し本剤の有効期間は常温で約3か月であり、高温・乾燥・多雨・日光照射などの気象条件により誘引効果を示す期間が短縮される場合があるので、適宜新しい製剤と交換して下さい。
- 本剤は使用する直前に開封し、併用するトラップに貼付し、周辺の樹木などに、地上より1～6mの高さに吊り下げて下さい。本剤を貼付したトラップの使用量は街路樹などの様な直線的に施用する場合は、40m当り1個以上、公園などの様な面的に施用する場合は10a当り3個以上として下さい。
- 本剤は使用する直前まで乾燥した冷暗所（約5℃）に保存して下さい。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法などに注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所など関係機関の指導を受けて下さい。